



عنوان : شیوع بارداری ناخواسته و مقایسه پیامد بارداری ناخواسته با بارداری برنامه ریزی شده

اصغر محمدپوراصل^۱، فاطمه رستمی^۲، سیده شیوا ترابی^۳، ریحانه ایوان بقاء^۴
زمینه و اهداف:

بر پایه خواهد، بارداریهای ناخواسته ممکن است اثر منفی بر نتایج بارداری از قبیل وزن کم هنگام تولد داشته باشد. هدف مطالعه حاضر برآورد شیوع بارداریهای ناخواسته و مقایسه پیامد بارداریهای ناخواسته و بارداریهای برنامه ریزی شده است.

روش بررسی:

در این مطالعه ۱۵۷۶ زن در ۶ بیمارستان و مراکز زایمانی شهر تبریز در شهریور ماه ۱۳۸۳ مورد مصاحبه قرار گرفتند. همچنین برخی اطلاعات از پرونده های پزشکی زنان و کارتهای مربوط به نوزادان در پرستانه ثبت گردید. اطلاعات شامل سابقه باروری، نوع زایمان، سقط، وضعیت جسمی نوزاد، وزن هنگام تولد و مشخصات دموگرافیک بود. داده ها با استفاده از آزمون مجذور کای و آزمون مستقل در نرم افزارهای SPSS و EPI تجزیه و تحلیل گردید.

یافته ها:

نتایج نشان داد که ۲۶/۷٪ از موارد حاملگی ناخواسته داشتند. نوع زایمان، وضعیت جسمی نوزاد و وزن هنگام تولد در بارداریهای ناخواسته با بارداریهای برنامه ریزی شده مشابه بود ($P > 0/05$). درصد سقط در بارداری های ناخواسته و حاملگی های برنامه ریزی شده به ترتیب ۹/۲۸٪ و ۵/۳٪ می باشد که از نظر آماری اختلاف معنی داری دارند.

نتیجه گیری:

تحقیقات بیشتری نیاز است تا تاثیر بارداری ناخواسته بر پیامد بارداری مشخص شود.

کلید واژه ها: بارداری ناخواسته، پیامد، وزن هنگام تولد، شیوع

۱- مربی، اپیدمیولوژی - مرکز کنشوری برنامه مدیریت سلامت (NPMC)، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۲- کارشناسی ارشد آموزش پرستاری کودکان

۳- دانشجوی سال آخر کارشناسی مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - نویسنده رابط

۴- مربی دانشکده پرستاری و مامایی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز